

レジメン名	疾患名	診療科名	登録日	催吐リスク	1クール 日数	抗がん剤	投与量	単位	投与日	状態確認目安(Day)
Bev(10mg/kg・2週毎)+TMZ併用	悪性神経膠腫	脳神経外	2013/11/14	中程度リスク	28	ベバシズマブ テモゾロミド(内服)	10 150	mg/kg mg/m ²	1、15 2～6	3週目
Bev(10mg/kg・2週毎)+TMZ併用 (維持療法期)	悪性神経膠腫	脳神経外	2013/11/14	中程度リスク	28	ベバシズマブ テモゾロミド(内服)	10 150	mg/kg mg/m ²	1、15 2～6	3週目
Bev(10mg/kg・2週毎)再発	悪性神経膠腫	脳神経外	2013/11/14	最少度リスク	14	ベバシズマブ	10	mg/kg	1	2週目
Bev(15mg/kg・3週毎)単独療法 期	悪性神経膠腫	脳神経外	2013/11/14	最少度リスク	21	ベバシズマブ	10	mg/kg	1	2週目
TMZ(150mg/m ²)	悪性神経膠腫	脳神経外	2015/08/11	中程度リスク	28	テモゾロミド	150	mg/m ²	1～5	2週目
TMZ(200mg/m ²)	悪性神経膠腫	脳神経外	2015/08/11	中程度リスク	28	テモゾロミド	200	mg/m ²	1～5	2週目
トシズマブ点滴静注用	関節リウマチ、若年性特 発性関節炎	内科・腎臓内科	2012/05/15	-	28	トシズマブ	8	mg/kg	1	2週目
インフリキシマブ点滴静注用	ベーチェット病による難治 性網膜ぶどう膜炎、乾 癬、強直性脊椎炎、ク ローン病、潰瘍性大腸 炎、関節リウマチ	内科・腎臓内科	2012/08/23	最少度リスク	56	インフリキシマブ	5	mg/kg	1	2週目
ナタリズマブ点滴静注用	多発性硬化症	神経内科	2021/12/15	最少度リスク	28	ナタリズマブ	300	mg/body	1	2週目